



<p>Centre de référence des maladies auto- inflammatoires</p>  <p>CeRéMAI</p>	<p>MODE D'EMPLOI</p> <p>PELEVEMENT URINES POUR DOSAGE DE MEVALONATURIE</p>	
---	--	---

1. Prélever les urines dans une bouteille d'eau minérale propre
 - a. au moment de la crise fébrile avec température > 38.5°C
 - b. de préférence le 2^e jour de la fièvre
 - c. les premières urines du matin

2. Mettre environ 10 ml de la miction dans un pot à ECBU

3. Les patients vivant à proximité de l'hôpital Necker-Enfants malades peuvent apporter eux-mêmes les urines accompagnées de l'ordonnance directement au laboratoire de Biochimie Métabolique :

Hôpital Necker
Tour Lavoisier 4^{ème} étage,
149 rue de Sèvres, Paris 15
75743 Paris cedex 15
tel: 01 71 19 64 84

Il est important que les urines arrivent au laboratoire moins de 12 heures après recueil si elles n'ont pas été congelées

4. En cas d'impossibilité d'apporter les urines au laboratoire à Necker dans les 12 heures après le recueil, congeler les urines immédiatement après le prélèvement.
 - a. Apporter les **urines congelées** à un laboratoire privé à proximité du domicile (pains de glace)
 - b. Le laboratoire se chargera de l'envoi des **urines congelées** au laboratoire de biochimie métabolique :

Hôpital Necker
Tour Lavoisier 4^{ème} étage,
149 rue de Sèvres, Paris 15
75743 Paris cedex 15
tel: 01 71 19 64 84

Protocole revu et validé par l'équipe médicale du CEREMAI le 19/10/2012